Patientinformation

Homepump vid infusioner med Foscavir®

Homepump är en engångs infusionspump. Den fungerar som en uppblåst ballong man långsamt släpper ut luften ifrån. Trycket i ballongen när den drar ihop sig driver pumpen. Den behöver därför inte hänga högt för att fungera utan kan läggas i avsedd Homepump äska, utanpå kläderna.

Vid inkoppling av pump är det viktigt att du iakttar följande:

- Tvätta först händerna noga och håll dig på en ren arbetsyta (undvik att ta på de delar som skall kopplas ihop).
- Fyll slangen, ta bort skyddshatten vid slangänden och öppna slangklämman. Det är viktigt att slangen fylls utan luftbubblor.
- När luften är borta och slangen fylld stänger du slangklämman.
- Anslut sedan till kanyl eller motsvarande.
- Öppna slangklämman och infusionen startar.
- Kontrollera att slangen inte ligger i kläm.
- Nedre delen av slangen skall normalt ligga i kontakt med huden. Om slangen nedanför det runda filtret utsätts för stora temperaturvariationer kan pumpen gå fortare eller långsammare.
- Undvik att duscha och bada pumpen.
- Pumpen tål att tappas i golvet.

Vid rodnad, smärta eller läckage, stäng pumpen med slangklämman och kontakta sjukhuset!

Efter avslutad infusion:

- Stäng slangklämman.
- Stäng trevägskran eller motsvarande.
- Skruva loss pumpslangen moturs.
- Spola kranen eller motsvarande med NaCl-lösning 9 mg/ml.
- Återförslut kanyl eller motsvarande.

Vid kylskåpsförvaring av Homepump skall pumpen läggas i rumstemp. 8 timmar före infusion så att vätskan är rumstempererad vid infusionsstart.

Om det skulle uppstå några problem eller om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta:

Mottagning **tfn: .....**

Avdelning **tfn: .....**